東京大学新聞
平成27年6月23日（火）

最高水準の実験技術で

理論証明の現場

実際に実験が理論を証明（究明）に話を聞いた。これするとはどういうことなのうか。「量子力学の理論より導かれる「量子の非局所性」の存在を初めて実験で証明した古澤明教授（工学系研究科）にお

図1



アインシュタインが「回折した単一光子は空間的に広がるが、異なる2点で同時に観測されない」と非局在性を予測

図2



Aの観測位相を変えると
観測されるBの量子状態が変化する

実験が生み出す未知

理論は真に正しいのか

「物理学は数学とは違います」と古澤教授。物理学は数学を理論を表現するための強化であり、有限個の式上の証明だけでは理論は完成しない。すなわち、その理論が現実の世界と合っているかの実験をする必要がある。

一方で、理論よりも実験や現象が先にあることの方が多いと古澤教授は話す。実験で発生した未知の概念の発展や、既存の知を超えた発見が、既存の構築につながるという。「例えば量子力学は、既存の理論では説明できない溶鉱炉の温度と鉄の色の関係を説明するために生まれた新しい理論だ。「実験→理論→実験→、というスパイラル

古澤 明（ふるさわ あきら）教授
（工学系研究科）

86年工学系研究科修士課程修了。博士（工学）。カリフォルニア工科大学客員研究員などを経て、07年より現職。

つ、二つという一次元の個数の情報しか持たない粒としての観測に比べ、波としての観測は振幅と位相という2次元の情報を持ち、情報量は格段に多い。

観測されるまでは粒子がどこに存在するか分からず、存在する状態と、存在しない状態の「重ね合わせ」の状態となっている。だが観測をしてある一点に存在することが分かると他の場所では観測されることはない。このように粒子の有無について難しい場所で相互作用しているような「量子の非局所性」2光子の量子状態が「回折し」た光子は空間的に広がるが、ある一点で光子が観測された瞬間、それ以外の場所では観測されなくなる。「アインシュタインが「回折した単一光子は空間的に広がるが、異なる2点で同時に観測されない」と非局在性を予測」

観測された瞬間、それ以外の場所では観測されなくなる。「アインシュタインが「回折した単一光子は空間的に広がるが、異なる2点で同時に観測されない」と非局在性を予測」

実験では光子を部分反射ミラーによって2経路に分け、2点で光子の振幅を観測した（図2）。光子一粒分の光を2カ所で観測した時、片方の観測の位相を変えると、もう片方の観測結果に影響を与えることが分かった。これは一粒の光子の状態が観測によって2カ所で相互作用を起こしていることを示し、光子が非局在化していることを証明した。

「今回の実験は我々の光の技術が世界最高水準にあり、オーストラリアの物理学者ハワード・ワイズマン教授から、自らの提唱した量子の非局所性を証明する実験方法を実際に試すため、実験協力を持ち掛けられた。

「今回の量子の非局所性の証明によって、これまで未証明のまま使っていた原理に証明が与えられて、気分の悪さがなくなりました。量子コンピュータの研究は量子の非局所性は当然存在するものとして進められてきましたが、これで心配することなく量子コンピューターの研究が進められるという。

「量子力学が誕生して100年がたち、やっと現在それをミクロのレベルで実験して実証できる段階まできた。物性物理学や数学、物質科学の分野でも量子力学が基本になる。量子力学の考え方を応用することができるが、量子が多数たったときの振る舞いは複雑で、また分からないことも多い。「世界中で毎日のように発見があり、新しい理論も生まれています」

古澤教授の目標は量子コンピューターの実現。今回の「量子の非局所性」の高精度な実験的証明は、不可能と考えられている量子コンピューター実現の可能性を自ら見える形にした。「量子一つ一つを一寮に確実に扱う技術（ここまで来ているのだ」と示すことができました。この技術力で量子コンピューター実現に向けて研究に励む。

一つ一つ寧に扱う技術を開発していたという。その技術が現在のレーザー光子を扱う技術の精度の高さ思考実験によって提唱した（図1）。今回の実験では光子が存在している状態と存在しない状態の重ね合わせを波として捉え、その相互作用を波の測定によって観測した。

医学書買取レスキュー
www.igakusho.jp